

소나무재선충 및 매개충 동시방제

푸른솔



분산성액제

- ▶ 산림청 나무주사용 약제로 선정
- ▶ 소나무재선충 및 매개충(북방하늘소, 솔수염하늘소) 동시방제
- ▶ 주요 산림해충에 2년간 효과 지속

품목명: 아바멕틴 + 설폭사플로르 (1.8+4.2)% | 약효보장기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 | 급 | 포장단위: 10mL x 10EA, 4L x 4EA | 작용기작: 6+4c

적용 해충 및 사용량

작물명	적용 해충	사용시기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
곰솔	솔껍질깎지벌레	후약충기 나무주사	원액 1mL/흉고직경cm	-	-
	소나무재선충	1~2월 또는 4~5월 원액 나무주사		-	-
	솔잎혹파리	성충 우화 전 나무주사		-	-
	솔수염하늘소			-	-
소나무	솔나방	월동유충 활동기 나무주사	원액 0.4mL/흉고직경cm	-	-
	솔껍질깎지벌레	후약충기 나무주사	원액 1mL/흉고직경cm	-	-
	전나무잎응애	발생 초 나무주사	원액 0.5mL/흉고직경cm	-	-
	소나무왕진딧물			-	-
양버즘나무(프라타나스)	버즘나무방패벌레	성충 발생기 나무주사	-	-	
왕벚나무	벚나무깎지벌레	발생 초 나무주사	-	-	
잣나무	북방수염하늘소	성충 우화 전 나무주사	원액 1mL/흉고직경cm	수확 7개월 전	1회 이내
	소나무재선충	1~2월 나무주사			
철쭉	갈색날개매미충	다발생기 경엽처리	10mL	-	-
	꽃매미			-	-
	점박이응애	한 잎당 3~5마리 발생시 경엽처리		-	-
	미국선녀벌레	다발생기 경엽처리		-	-



원예용 살충제

235 | 푸른솔 분산성액제

주의사항

- ▶ 수관부가 발달한 대형목은 사용개수를 50% 범위 내에서 적절히 증가시켜 주십시오.
- ▶ 수고가 낮은 반송, 다형송, 조형송인 경우 약제가 한가지에 몰릴 수 있으니 주의하십시오.
- ▶ 나무의 흉고직경이 8cm 이하인 경우 사용하지 마십시오.

푸른솔 전용 액상색소 사용방법



1. 푸른솔 1박스에는 4L포장 4통과 전용 액상색소(적색) 80ml(4통용) 1병이 포함
2. 푸른솔 전용 액상색소를 병뚜껑으로 20ml(한 뚜껑) 계량
3. 계량한 전용 액상색소 20ml를 푸른솔 1통에 넣고 흔들어서 희석 후 사용

* 액상색소 80ml는 4통(1박스)용이므로 사용 후 잔량을 남기지 마십시오.

■ 전용 액상색소를 사용한 시인성 시험과 약효약해시험을 실시로 안전성 확인(2019년, ㈜에스엠바이오)

