

뿌리까지 죽이는 풀다이!

풀다이



액제

- ▶ **뿌리까지 이행하는 비선택성 제초제**
식물체의 줄기와 잎 부위에서 흡수되어 처리 2~3일 이내 잡초의 선단 부위가 구부러지고, 황변 시작, 갈변, 고사 후 효과가 40일 정도까지 지속
- ▶ **확실하고 오래가는 효과**
잡초의 체내 이행성이 뛰어난 2가지 성분이 함유되어 더 확실한 효과 발휘(쇠뜨기, 망초, 깨풀 등) 토양 피복 효과로 새로 나오는 잡초의 발생 억제!
- ▶ **세척, 경사지 토양이동성 문제없어 안전하게 사용!**


품목명: 글리포세이트이소프로필아민+트리클로피르티에이 (35+3.3%) | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III급 | 포장단위: 500mL | 작용기작: G+O

적용 잡초 및 사용량


작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a) 당 사용약량
감	일년생 잡초 및 다년생 잡초	잡초생육기 경엽처리	300mL
감귤밭			
단감			
배			800mL
복숭아			
비농경지			
사과밭	300mL		

풀다이 액제 처리 후 효과 발현 양상

처리 전



처리 3~6일 후



처리 14~40일



원예용 비선택성 제초제


풀다이 액제는 어떻게 효과를 발휘하는가

- 식물체의 줄기와 잎 부위에서 흡수 → 잡초의 체내 이동, 분열조직에 축적 → 처리 2~3일 이내 잡초의 선단 부위가 구부러지고, 황변 시작 → 갈변, 고사

성분1 (Glyphosate-IPA)		성분2 (Triclopyr-TEA)	
작용기작	아미노산 생합성 억제	작용기작	호르몬 균형 간섭
가시적 효과	황화, 갈변, 조직괴사	가시적 효과	잎과 줄기 꼬임, 구부러짐, 생육억제, 조직 괴사

쇠뜨기에 대한 풀다이 액제의 효과

- 쇠뜨기는 지상부의 생육이 왕성하고 군집 형태를 이루고 있으며, 지하부의 헛뿌리도 깊이 1m 이상 모두 연결되어 가장 방제하기 어려운 잡초 초종 중에 하나
- 쇠뜨기에 대해 효과를 발휘하는 성분의 이행형제초제가 근본적인 효과를 발휘



▶ 쇠뜨기 지상부 및 지하경 헛뿌리 분포모식도 - 뿌리부위가 1m까지 연결



▲ 풀다이 액제

원예용
비선택성 제초제

255 | 풀다이 액제