

# 풀약



액제

## ▶ 빠르게 나타나는 효과

잡초의 잎과 줄기로 빠르게 흡수되어 1~3일부터 약효 발현됨

## ▶ 확실한 효과

잡초의 접촉부위와 생장점에 영향을 주어 잡초를 고사시키는 2가지 성분을 함유하고 있어  
빠르고 확실하게 방제함

특히 쇠뜨기, 닭의장풀, 망초 등의 난방제 초종에 효과적인 비선택성 제초제

## ▶ 과수원 등 그늘에서도 효과가 확실함

HOT

품목명 : 글루포시네이트암모늄 + 트리클로피르티아에이 (10+5)% | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위 : 300mL, 500mL | 작용기작 : H+O

### 적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000m <sup>2</sup> (10a)당 사용약량
감귤밭, 감밭, 배밭	일년생 잡초 및 다년생 잡초		
배추	일년생 잡초		500mL
복숭아밭		잡초생육기 경엽처리	
비농경지	일년생 잡초 및 다년생 잡초		1,000mL
사과밭			500mL

### 주의사항

- ▶ 이 농약은 비선택성 제초제이므로 농작물의 잎, 어린줄기, 과실, 로터리 작업 후 노출된 뿌리 등에 직접 묻을 경우에 심한 피해가 일어나므로 주의하여 사용하십시오.
- ▶ 이 농약을 사용할 경우에는 반드시 비선택성 제초제 전용분무기 및 별도의 살포기구(호스 및 노즐 포함)를 사용하시고, 이 농약을 사용한 살포기구로 다른 살충제, 살균제나 비료를 절대 사용하지 마십시오.
- ▶ 이 농약을 사용한 비선택성 제초제 전용 분무기를 사용한 후에는 반드시 깨끗한 물로 충분히 세척한 후에 안전한 장소에 보관하여 주십시오.
- ▶ 약액이 작물에 묻을 경우, 심한 피해가 발생하므로 반드시 저비산 노즐과 깔때기를 써우고 약액이 바람에 날려 비산되지 않도록 주의하십시오.

닭의장풀, 명아주, 바랭이 등 경기 가평 사과밭 (처리일 : 7월 12일)



쇠뜨기 충남 예산 비농경지 (처리일 : 8월 7일) 3일차

