

풀체인지

액상수화제

풀체인지

수도용
제초제

- 품목명 : 프로피리실퓨론 - 1.5%, 브로모부타이드 - 18%
- 약효보증기간 : 4년
- 독성 : 저독성, 어독성Ⅲ급
- 포장단위 : 500mℓ x 20EA
- 작용기작 : Z+B

- 신규 성분으로 피, 일년생 및 다년생 잡초에도 우수한 효과를 발휘합니다.
- 액상 제형으로 간편하고 가벼워 처리하기 편리합니다.
- 저항성을 갖는 물달개비(2엽 이내), 올챙이고랭이(2엽 이내) 방제에 효과우수
- 찰벼, 흑미, 인디카 계통의 다수성벼에도 비교적 안전하게 사용할 수 있습니다.

적용잡초 및 사용량

작물명	적용잡초	사용시기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량
기계이앙벼 (어린모)	일년생 잡초 (피, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀) 및	이앙 후 15일 원액수면 점적처리	500mℓ
	다년생 잡초 (올방개, 올챙이고랭이, 벼풀, 너도방동사니)		
	일년생 잡초 (피, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀, 사마귀풀) 및	이앙 후 10~12일 원액수면 점적처리	
	다년생 잡초 (올방개, 올챙이고랭이, 벼풀, 너도방동사니)		

사용방법

- 썬레질 작업을 균일하게 하고, 썬레질 후 2~3일경 모를 2~3cm깊이로 이앙한 다음 논물을 3~4cm정도로 대고, 논 전면에 골고루 뿌려 주십시오.
- 피에 대한 방제가능시기가 피 발생 전부터 2.5엽기 이내이므로 처리시기를 반드시 지켜주십시오. 피의 생육이 빠른 남부 지역에서는 처리시기를 앞당겨 주십시오.
- 썬레질 후 이앙시기가 늦어지거나, 물달개비, 올챙이고랭이, 올방개, 벼풀 등 방제하기 어려운 잡초가 많은 논에는 썬레질 후 바로 이앙 전 처리제를 살포하시고, 사용 15일 후에 이 약제를 뿌리십시오.
- 약을 뿌린 후 최소한 3~4일간은 논물이 마르지 않도록 논물관리를 철저히 해 주십시오.

주의사항

- 바람이 강하게 불 때에는 한쪽으로 약제가 쏠릴 가능성이 있으므로 바람이 불지 않는 시간에 살포해 주십시오.
- 논에 이끼나 괴불이 과다하게 발생한 경우에는 약제의 확산이 어려울 수 있으니 제거 후 사용해 주십시오.



▲ 이앙 후 10일 처리(6월4일)후 17일 경과(2010, 황성)



▲ 이앙 후 10일(5.24)처리 후 37일 경과



▲ 이앙 후 15일 처리(6월14일)후 34일 경과(2012, 경북예천)



▲ 이앙10일 처리(6월18일)후 30일 경과(2012, 경남하동)