

피에스타



유제

- ▶ 2원 합제로 접촉 및 이행성을 모두 갖추어 효과가 빠르고 우수합니다.
- ▶ 처리 2~3일 후부터 급격히 약제에 접촉된 부분부터 황변되어 2주 후 완전히 고사합니다.
- ▶ 잡초 체내로 빠르게 흡수되어 살포 후 6시간 내에 비가 오지 않을 경우 약효에 영향을 주지 않습니다.

품목명 : 사이할로프로부틸 + 프로파닐 (4.5+40)% | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 보통독성, 어독성Ⅲ급 | 포장단위 : 500ml x 20EA | 작용기작 : A+C2


적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량
기계이앙벼(어린이)	일년생 잡초 (피)	이앙 후 30일(피 5엽기이내) 경엽처리	500ml

효과적인 사용방법

- ▶ 추천된 사용량을 물에 희석하여 분무기로 잡초에 충분히 묻도록 경엽처리 하십시오.
- ▶ 일찍 발생한 피가 4~5엽기 정도일 때(분얼 전) 잡초에 충분히 묻도록 골고루 살포해 주십시오.
- ▶ 피를 기준으로 이앙30일 이내(4~5엽기)에 처리하는 것이 가장 효과를 발휘합니다.
- ▶ 광엽잡초 및 사초과잡초에 대해서는 효과가 없으므로 적용약제를 살포하십시오.
- ▶ 남부지방에서는 피의 발생과 생육이 빠르므로 피 발생 상태를 보고 추천사용시기 안에 사용하십시오.
- ▶ 이 농약은 전착제 성분이 충분히 함유되어 있기 때문에 별도의 전착제를 사용할 필요가 없습니다.

처리적기



주의사항

- ▶ 고온기 (30도씨 이상) 에는 약해의 우려가 있으니 살포에 주의하십시오.
- ▶ 중복살포를 금지해 주십시오.
- ▶ 약제 살포 후 2~3일 이내에 5cm이상 관수해 주십시오.
- ▶ 피5엽기 이후(분얼기)에는 급격히 효과가 떨어지므로 반드시 이앙 30일 이내(피 4~5엽기)에 살포하십시오.
- ▶ 피의 발생과 생육이 빠른 남부지방에서는 반드시 처리시기를 지켜주십시오.
- ▶ 처리시, 기상상황에 유의하시어, 가능한 오후나 저녁무렵을 이용하여 살포하십시오.
- ▶ 고압식분무기로 사용하면 약해가 날 수 있으니, 반드시 압력을 낮추고 노즐을 잘 선택하여 살포하십시오.
- ▶ 사용하는 날을 기준으로 전, 후 7~10일 이내에 유기인계, 카바메이트계 농약, 질소질 비료를 사용하면 특이적으로 약해가 날 우려가 있기 때문에 사용하지 마십시오.
- ▶ 약액이 바람에 날려 논두렁의 콩 재배지 등 인접 밭작물에 묻지 않도록 주의하십시오.



수도용 제초제