

조류와 잡초를 동시에

# 필사초



## 입제

- ▶ 담수직파와 기계이앙 모두 사용 가능합니다.
- ▶ 피, 가막사리, 자귀풀에 우수하며, 기타 일·다년생 잡초에도 효과적입니다.
- ▶ 제초효과와 동시에 조류방제 효과가 있습니다.

품목명: 아짐설프론 + 페녹솔람 + 시메트린 (0.05+0.07+0.3)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III급 | 포장단위: 3kg x 8EA | 작용기작: B+B+C1

## 적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량
기계이앙벼 (어린모)	일년생 잡초 (피, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생 잡초 (올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	이앙 후 15일 수면처리	3kg
담수직파벼 (표면산파)	일년생 잡초 (피, 물달개비, 여뀌바늘, 발뚝외풀, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생 잡초 (올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니, 가래)	파종 후 15일 수면처리	

## 효과적인 사용방법

- ▶ 씨레질 후 12~15일경 약제처리: 피를 비롯한 일년생 잡초가 많은 경우 조기에 처리하여 주십시오.
- ▶ 물달개비, 올챙이고랭이 등 저항성 잡초의 발생이 많은 논: 씨레질이 끝난 직후에 이앙전처리제(안나풀 액상수화제)를 처리하고 10~15일경 필사초 입제를 처리하여 주십시오.
- ▶ 약제 살포 후 논물 관리: 논바닥이 노출되지 않도록 최소 2~3일간 논물을 충분히 유지하여 주십시오.
- ▶ 씨레질 후 이앙시기가 늦어지거나 저항성 잡초, 올방개, 벼풀 등 난방제 잡초가 많은 논에는 먼저 씨레질 후 이앙 전 처리제를 살포 하시고, 이앙 전 처리제 사용 후 15일 경에 이 약제를 처리하십시오.



▲ 필사초 입제 처리포장: 피 및 가막사리에 효과 우수(조류 동시 방제)

## 처리적기



\* 기계이앙벼 기준

수도용  
제초제

73 | 필사초 입제