

과수전문 강력한
예방 및 치료용 약제

혜성



입상수화제

- ▶ **스트로빌루린계와 트리아졸계 약제의 합제**
크레속심메틸과 메트코나졸의 혼합제로서 예방 및 치료효과를 겸한 약제입니다.
- ▶ **크레속심메틸의 특이한 확산침투성과 침달효과**
크레속심메틸은 표면확산침투성과 침달효과가 우수하여 작물 전체에 고른 효과를 보입니다.
- ▶ **메트코나졸의 강력한 세포막 생합성 저해 효과**
메트코나졸은 포자발아, 균사신장, 부착기형성, 균사의 조직내 침입을 강력히 억제합니다.
- ▶ **뛰어난 약효 지속성과 내구성**
약효지속성이 우수하고 내우성이 뛰어나 안정된 효과를 발휘합니다.

품목명 : 크레속심메틸+메트코나졸 (20+10)% | 약효보존기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 | 급 | 포장단위 : 250g x 40EA | 작용기작 : 다3+사1

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
감(단감 포함)	등근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리	10g	수확 14일 전	4회 이내
감귤	더듬이병	춘지발생 초 15일 간격 경엽처리		수확 7일 전	
	잿빛곰팡이병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
마늘	녹병		중구파종직전 토양 분무처리	10g(1ℓ/m ²)	수확 14일 전
	흑색썩음균핵병	수확 7일 전		3회 이내	
배	잎마름병	발병 초 10일 간격 경엽처리	10g	수확 14일 전	4회 이내
	붉은별무늬병			수확 21일 전	5회 이내
	검은별무늬병				
복숭아	검은무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리	10g	수확 14일 전	4회 이내
	잿빛무늬병				
사과	갈색무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	10g	수확 14일 전	4회 이내
	탄저병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리			
	겉무늬썩음병				
양파	점무늬낙엽병	발병 초 10일 간격 경엽처리	10g	수확 14일 전	4회 이내
	노균병	발병 초 7일 간격 경엽처리			
	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
인삼	잿빛곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리	10g	수확 50일 전	3회 이내
	점무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
	검은무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
파	흑색썩음균핵병	정식 전 토양 분무처리	10g(1ℓ/m ²)	정식기	1회 이내
	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리	10g	수확 14일 전	4회 이내
포도	새눈무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리			
	갈색무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리			



원예용
살균제

150 | 혜성 입상수화제