

진짜 빠르고 정말 확실한

확타



미탁제

- ▶ **빠르게 나타나는 효과**
잡초의 잎과 줄기로 빠르게 흡수되어 1~3일부터 약효 발현
- ▶ **이 농약은 과수원 및 비농경지, 발작물 헛골에 발생하는 일년생 및 다년생 잡초에 광범위한 효과 발휘**
망초, 쑥, 쇠비름, 쇠뜨기, 토끼풀, 메꽃, 환삼덩굴 등에 효과 발휘
- ▶ **후작물에 안전한 제초제**
땅에 떨어지면 곧 분해가 되므로 토양에 축적될 우려가 없어, 사용 후에 작물을 파종, 이식해도 안전함

HOT

품목명: 플루티아세틸 + 글루포시네이트암모늄 (0.2+12)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 300ml x 30EA, 400ml x 20EA, 500ml x 20EA | 작용기작: E+H

적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a) 당 사용약량
감귤밭 감밭	일년생 및 다년생 잡초	잡초 생육기 경엽처리	400ml
감자밭	일년생 잡초	잡초 생육기 밭고랑(휴간) 잡초 경엽처리 (비닐피복 재배)	
고령영귀귀(곤드레나물)		잡초 생육기 밭고랑(휴간) 경엽처리	
고추밭		잡초 생육기 밭고랑(휴간) 잡초 경엽처리 (비닐피복 재배)	
논둑 대추밭	일년생 및 다년생 잡초	잡초 생육기 경엽처리	500ml
두릅나무 마늘밭(휴간)	일년생 잡초	잡초 생육기 밭고랑(휴간) 잡초 경엽처리 (비닐피복 재배)	400ml
매실밭	일년생 및 다년생 잡초	잡초 생육기 경엽처리	
무밭	일년생 잡초	잡초 생육기 밭고랑(휴간) 경엽처리 (비닐피복 재배)	
무화과 배	일년생 및 다년생 잡초	잡초 생육기 경엽처리	500ml
배추밭	일년생 잡초	잡초 생육기 밭고랑(휴간) 잡초 경엽처리 (비닐피복 재배)	
복숭아밭	일년생 및 다년생 잡초	잡초 생육기 경엽처리	
비농경지		잡초 생육기 경엽처리	
사과밭		일년생 잡초	잡초 생육기 밭고랑(휴간) 경엽처리 (비닐피복 재배)
산딸기	400ml		
양파밭			잡초 생육기 밭고랑(휴간) 경엽처리 (비닐피복 재배)
옥수수밭		일년생 및 다년생 잡초	잡초 생육기 경엽처리
유자밭	일년생 잡초	잡초 생육기 밭고랑(휴간) 경엽처리 (벗짚피복 재배)	400ml
인삼밭	일년생 및 다년생 잡초	잡초 생육기 경엽처리	
자두밭	일년생 잡초	잡초 생육기 밭고랑(휴간) 잡초 경엽처리 (비닐피복 재배)	
참깨밭 콩밭 파밭	일년생 잡초	잡초 생육기 경엽처리	



원예용 비선택성 제초제

260 | 확대 미탁제

FTM 개요

Fluthiacet-methyl은 티아디아졸계 광퇴색 제초제로, 잡초의 세포막을 파괴하여 강력한 살초력을 발휘합니다.

제품특징

- 광엽잡초 및 외래잡초 방제에 탁월
 - 약 90cm 크기까지의 어저귀 방제가 가능하며 기타 광엽잡초는 40cm까지 방제 가능
 - 일년생 광엽잡초 방제효과 탁월
- 뛰어난 속효성
 - 주요 광엽잡초 대상 24시간 이내에 번다운 효과가 나타나며, 처리 후 48시간 이내 잡초 고사
- 후작물 안전성
 - 토양잔류에 의한 영향이 미비하여 재식이나 후작물에 대한 영향은 전혀 없음
- 환경 안전성
 - 토양반감기가 매우 짧기 때문에 작물 재배시 다양하게 사용 가능
 - 토양에 도달 시 주로 미생물이나 광에 의해 분해가 일어남

효과적인 사용방법

- 확타는 잡초 생육기 경엽처리용 제초제입니다. 잡초가 충분히 자랐을 때 잎과 줄기에 약액이 충분히 묻도록 살포하십시오.
- 잡초가 20~30cm 정도 자랐을 때 살포하면 가장 효과적이며 잡초가 30cm 이상 자라거나 발생밀도가 높을 때에는 약량을 증가시켜 살포하면 효과적입니다.

확실한 살초력

확타는 최근 발생이 증가하고 있는 쇠뜨기, 개망초, 소리쟁이, 제비꽃 등을 효과적으로 방제하여 농가에 만족감을 드릴 수 있습니다.

개망초 (국화과, 다년생) 8월 24일 처리



제비꽃 (제비꽃과, 다년생) 8월 24일 처리



토끼풀 (콩과, 다년생) 8월 24일 처리



원예용
비선택성 제초제

강력한 속효성

신규원제 FTM과 글루포시네이트암모늄의 상승작용으로 최근 문제되는 깨풀, 쑥, 메꽃, 환삼덩굴, 쇠비름 및 주요 외래잡초를 빠르게 방제할 수 있습니다.

명아주 (명아주과, 일년생) 5월 12일 처리 4일 후



확타



대조A



대조B



무처리

작물 안전성 (후작물/헛골)

확타는 작물 이행력이 없어 약제가 닿는 부위만 효과가 발현되고 뿌리에 영향이 거의 없습니다.

경기 용인· 고추 정식, 무파종



5월 5일 처리



5월 6일 정식



5월 16일 조사



5월 6일 정식



5월 16일 조사

고추·헛골·경기 용인· 쇠비름, 까마중, 명아주 발생



6월 22일 처리



6월 26일 조사

배추·헛골·강원 횡성· 바랭이, 쇠비름



8월 15일 처리



8월 18일 조사

주의사항

이 제품은 반드시 제초제 전용 분무기로 살포해야 하며, 동력식 분무기는 사용하지 마십시오.



원예용
비선택성 제초제