

# 문고카트

수화제



- ▶ 예방 및 치료효과가 우수, 약효 지속기간이 길어 발병초기부터 살포 시 뛰어난 약효
- ▶ 이삭 팬 후에 뿌려도 약해 없이 안전

품목명 : 펜사이큐론 (25)% | 약효보증기간 : 3년 | 독성 : 저독성, 어독성Ⅲ급 | 포장단위 : 250g x 50EA | 작용기작 : 나4


## 적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용약량	안전사용 기준	
					시기	횟수
벼 수수	잎집무늬마름병	발병초(7월 상순)부터 경엽처리	10g	140~160ℓ	수확 30일 전	3회 이내
		발병초 7일 간격 경엽처리	20g	-		
아욱	마름병	발병초 7일 간격 경엽처리	10g	-	수확 7일 전	-
잔디	라이족토니아마름병	발병초기부터 7일 간격 토양관주	20g	1ℓ/㎡	-	-

## 효과적인 사용방법

- ▶ 약액이 잎집에 충분히 묻도록 뿌리십시오.
- ▶ 벼이삭이 팬 후에 병무늬가 윗 잎집으로 번질 때는 한번 더 약을 뿌리십시오.
- ▶ 잔디 라이족토니아마름병 : 병 발생초기부터 7일 간격으로 1,000배로 희석한 약액을 ㎡당 1ℓ 씩 토양관주하여 주십시오.
- ▶ 병 발생이전에(7월 상순 이전) 예방적으로 살포하여 주십시오.

## 대상 병해



▲ 잔디 라이족토니아마름병



▲ 벼 잎집무늬마름병