

스미치온



유제

- ▶ 과수, 수목 해충방제에 광범위하게 사용되는 종합살충제
- ▶ 외래해충, 돌발해충 등 공동방제에 최적
- ▶ 노린재 피해 방제에 뛰어난 효과

품목명: 페니트로티온 (50%) | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III급 | 포장단위: 500mL × 20EA, 1L × 15EA | 작용기작: 1b

적용 해충 및 사용량

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
가지	담배거세미나방			수확 5일 전	2회 이내
감국	국화꼬마수염진딧물		20mL	수확 30일 전	1회 이내
강낭콩	갈색날개노린재	발생 초 경엽처리		수확 21일 전	2회 이내
거베라	뿌리응애		20mL(1L/㎡)	발생 초기	-
고사리	석점박이방아벌레불이			수확 7일 전	2회 이내
국화	빗살무늬미주메뚜기	약충 발생 초 경엽처리		발생 초기	-
가죽나무	꽃매미	어린약충기(5월) 수간처리	20mL	-	-
국화	초록장님노린재	발생 초 경엽처리		-	-
금감(금귤)	갈색날개노린재			수확 7일 전	2회 이내
기장	시골가시히리노린재	다발생기 경엽처리		수확 14일 전	
낙엽송	담배거세미나방	발생 초 경엽처리	20mL(5mL/주)	-	-
	파밤나방			-	-
	빗살무늬미주메뚜기	약충 발생 초 경엽처리		발생 초기	-
다래	썩덩나무노린재	발생 초 경엽처리		수확 21일 전	2회 이내
다정큼나무	거북밀깍지벌레	약충 다발생기 경엽처리		-	-
단풍나무	미국흰불나방			발생 초기	-
당귀(잎, 뿌리)	홍줄노린재			수확 7일 전	
당근	담배거세미나방			수확 14일 전	
동부	갈색날개노린재	발생 초 경엽처리		수확 21일 전	2회 이내
레몬	톱다리개미히리노린재			수확 7일 전	
마늘	뿌리응애	피복제거 후 토양관주처리	20mL(1L/㎡)	수확 70일 전	1회 이내
	마늘혹응애	발생 초 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전	
매실	톱다리개미히리노린재	다발생기 경엽처리		수확 21일 전	
	매실애기잎말이나방				
머루	미국선녀벌레	발생 초 경엽처리	20mL		2회 이내
	파밤나방				
멜론	담배거세미나방			수확 7일 전	
무화과	빗살무늬미주메뚜기	약충 다발생기 경엽처리			
	긴꼬리가루깍지벌레	발생 초 경엽처리			

원예용
살충제

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
미나리	담배거세미나방	발생 초 경엽처리		수확 14일 전	
밤	복숭아명나방	성충발생기 10일 간격 경엽처리		수확 21일 전	2회이내
백합나무	파밤나방			-	-
	담배거세미나방	발생 초 경엽처리	20㎖	-	-
복분자	미국선녀벌레			수확 7일 전	
복숭아	나무좀류	꽃이 피기 전후 각 1회 경엽처리			
부추	고자리파리 뿌리응애	예취직후 토양관주처리	20㎖ (1ℓ/m ²)	수확 40일 전	
블루베리	거북밀깍지벌레	발생 초 경엽처리		수확 7일 전	
사과	잎말이나방 빗살무늬미주메뚜기	꽃이 피기 전 및 꽃이 진 후 20일부터 8월초순 경엽처리 약충 발생 초 경엽처리		수확 21일 전	2회이내
산딸기	미국선녀벌레		20㎖		
생강	담배거세미나방	발생 초 경엽처리		수확 7일 전	
	솔수염하늘소	성충우화 최성기 경엽처리	40㎖	-	-
소나무	솔나방	월동유충 활동기 4~5월, 부화유충 활동기 8월 하순~9월 중순 경엽처리	13.3㎖	-	-
	솔잎혹파리	산란직후부터(6월상순) 경엽처리		-	-
소나무류	솔껍질깍지벌레	발생 초 경엽처리	20㎖	-	
신갈나무	대벌레	약충 발생 초 경엽처리		발생 초기	-
쑥	국화하늘소	유충발생 초 경엽처리	40㎖	수확 14일 전	1회이내
아까시나무	대벌레	약충 발생 초 경엽처리		발생 초기	-
아로니아	썩덩나무노린재 톱다리개미허리노린재	발생 초 경엽처리		수확 3일 전	2회이내
양미나리(셀러리)	담배거세미나방		20㎖	수확 7일 전	1회이내
	미국선녀벌레	다발생기 경엽처리			
양앵두(체리)	갈색날개노린재	발생 초 경엽처리		수확 14일 전	
	갈색날개매미충	다발생기 경엽처리			
양파	파잎벌레	발생 초 경엽처리		수확 7일 전	2회이내
	뿌리응애	월동 후 토양 관주처리	20㎖(1ℓ/m ²)	수확 30일 전	
오렌지	톱다리개미허리노린재	다발생기 경엽처리			
	갈색날개노린재	발생 초 경엽처리	20㎖	수확 45일 전	
유자	톱다리개미허리노린재	다발생기 경엽처리			1회이내
자운영	알팔파바구미			-	-
잔디	풍뎅이	유충부화기 토양관주	20㎖(3ℓ/m ²)	-	-
	잔디밤나방	다발생기 경엽처리		-	-
쥐똥나무	별박이자나방	발생 초 경엽처리	20㎖	-	-
쪽파	뿌리응애	발생 초 관주처리	20㎖(1ℓ/m ²)	수확 60일 전	1회이내
차	뿔밀깍지벌레	발생 초 경엽처리	20㎖	수확 7일 전	3회이내
참나무류	광릉긴나무좀	우화최성기 10일 간격 수간처리	40㎖	-	-
취나물	긴날개밑들이메뚜기	발생 초 경엽처리		수확 7일 전	2회이내
콩	담배거세미나방		20㎖	수확 14일 전	3회이내
	빗살무늬미주메뚜기	약충 발생 초 경엽처리			



원예용
살충제

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
콩	콩나방	발생 초 10일 간격 경엽처리	20㎖	수확 14일 전	3회 이내
	노린재류	착협기부터 7~10일 간격 경엽처리			
파(쪽파 포함)	뿌리응애	발생 초 관주처리	20㎖(1ℓ/m ²)	수확 60일 전	1회 이내
팥	풀색노린재	다발생기 경엽처리	20㎖	수확 21일 전	2회 이내
편백	담배거세미나방	발생 초 경엽처리		-	-
	파밤나방	발생 초 경엽처리		-	-
호프	매실애기잎말이나방	다발생기 경엽처리	20㎖	수확 7일 전	2회 이내
화살나무	노랑털알락나방	발생 초 경엽처리		-	-

주의사항

- 사과의 꽃이 피기 직전과 직후부터 20일 이전까지는 살포하지 마시고, 특히 사과의 육품종에는 약해의 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
- 이 농약은 십자화과 작물(배추, 양배추, 브로콜리, 케일, 무, 냉이, 갓, 순무 등)에는 약해가 발생할 우려가 있으므로 부근에 있는 경우에는 약제가 닿지 않도록 주의하십시오.
- 편백나무에 대하여는 개체에 따라 낙엽, 가지마름 등의 우려가 있으므로 부근에 있는 경우에는 약제가 닿지 않도록 주의하십시오.
- 약제를 중복 살포할 경우 약해의 우려가 있으므로 중복 살포하지 마십시오.
- 이 농약은 꿀벌에 피해가 있으므로 꽃이 피어있는 동안에는 사용하지 마십시오.
- 이 농약은 야생조류에 피해를 줄 수 있으므로 사용에 주의하십시오.
- 이 농약은 자동차, 벽 등의 도장면, 대리석, 화강암에 살포액이 묻으면 변색할 우려가 있으므로 살포액이 묻지 않도록 주의하십시오.
- 이 농약은 눈에 대하여 자극성이 있으므로 눈에 들어간 경우에는 바로 물로 씻고, 안과의사의 진찰을 받으십시오.
- 이 농약은 피부에 대하여 자극성이 있으므로 피부에 묻지 않도록 주의하십시오. 묻은 경우에는 즉시 돌가루로 씻어내십시오.



원예용
살충제