

나방과 진딧물을 동시에

신나고



액상수화제

- 진딧물, 나방 동시방제
- 원에 채소 및 과수 종합살충제
- 꿀벌에 안전한 살충제

품목명: 티플루자마이드+티아클로프리드 (10+10)% | 약효보존기간: 4년 | 독성: 보통독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 100ml x 100EA, 170ml x 40EA, 400ml x 20EA, 1ℓ x 15EA | 작용기작: 28+4a

적용 해충 및 사용량

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
고추(단고추류 포함)	목화진딧물	다발생기 경엽처리	10ml	수확 3일 전	3회 이내
	대만총채벌레	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	담배나방	발생 초 10일 간격 경엽처리			
딸기	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리	6.7ml	수확 2일 전	2회 이내
	파밤나방	발생 초 7일 간격 경엽처리			
매실	복숭아유리나방	발생 초 10일 간격 수관처리	6.7ml	수확 21일 전	3회 이내
배추	배추좀나방	다발생기 경엽처리	10ml		2회 이내
	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리			
복숭아	복숭아순나방	발생 초 7일 간격 경엽처리	6.7ml	수확 14일 전	3회 이내
	복숭아가루진딧물	다발생기 경엽처리			
사과	복숭아순나방	발생 초 7일 간격 경엽처리	10ml	수확 2일 전	2회 이내
	사과혹진딧물	다발생기 경엽처리			
	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리			
토마토(방울토마토 포함)	온실가루이	발생 초 7일 간격 경엽처리	10ml	수확 2일 전	2회 이내
	왕담배나방	발생 초 10일 간격 경엽처리			

효과적인 사용방법

- 저항성이 우려되므로 한 세대에만 2~3회 사용하시고 다음 세대에는 다른 계통의 약제를 사용해 주십시오.
- 액상수화제이므로 살포 전에 잘 흔들어 사용하십시오.

방제효과 시험

고추 담배나방 (2013, 충북대학교)



사과 복숭아순나방 (2014, 충남대학교 농업과학연구소)



신나고
원에용
살충제

196 | 신나고 액상수화제