

오마이트



수화제

- ▶ 고온기 기화로 인한 훈증 작용으로 약효 상승
- ▶ 사과, 감귤에 발생하는 응애류 종합방제
- ▶ 속효성인 동시에 장기간 약효 지속

품목명: 프로파자이트 (30)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 II 급 | 포장단위: 500g x 20EA | 작용기작: 12c

적용 해충 및 사용량

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
감귤	굴응애	10월 이후 한 잎당 3~4마리 정도 발생할 때 경엽처리	27g	수확 14일 전	3회 이내
사과	사과응애	꽃 피기 전과 꽃 진 후 한 잎당 3~4마리 정도 발생할 때 경엽처리		수확 7일 전	
포도	점박이응애	한 잎당 2~3마리 발생할 때 경엽처리	20g	수확 21일 전	2회 이내
호프				수확 14일 전	

주의사항

- ▶ 꿀벌에 피해가 있으므로 꽃이 피어있는 동안에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 감귤의 봄순과 여름순 및 과피가 완전히 굳어지기 전에는 약해가 생길 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
- ▶ 석회유황합제, 석회보르도액, 기계유유제, 다수진(다이아통, 시니나)과 같은 알칼리성 약제와 섞어 쓰지 마십시오.
- ▶ 특히 배나무에는 약해의 우려가 있으니 배나무 근처에서는 사용하지 마십시오.
- ▶ 사과의 '슈퍼골덴'에는 진하게 뿌릴 경우 약해가 발생하니 유의하십시오.
- ▶ 이 농약은 피부와 눈을 자극시킬 수 있으므로 방제복·보안경 등 방제 장비를 반드시 착용하십시오.

취급제한기준

- ▶ 살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수취수원, 해역 등으로 바람에 날려 들어가거나 빗물에 씻겨 직접 흘러 들어갈 우려가 있는 지역에서는 사용하지 마십시오.