

과수 주요 해충을
일회 방제로 한번에

유토피아



액상수화제

- ▶ 나방과 진딧물에 효과 우수한 종합살충제
- ▶ 진딧물에 빠른 낙다운 효과
- ▶ 곤충호르몬 교란작용에 의한 나방 살충효과

품목명: 클로티아니딘+메톡시페노자이드 (7+8)% | 약효보존기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 100mL x 100EA, 250mL x 40EA, 1L x 15EA | 작용기작: 4a+18

적용 해충 및 사용량

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20L당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
감(단감 포함)	톱다리개미허리노린재	발생 초 10일 간격 경엽처리		수확 21일 전	
	감꼭지나방				
감귤	애늪적밀빠진벌레	발생 초 경엽처리	10mL	수확 7일 전	
	자나방류	다발생기 경엽처리			
	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리			
고추(단고추류 포함)	곰굴나방	발생 초 10일 간격 경엽처리		3회 이내	
	목화진딧물				
배	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리		수확 5일 전	
	꼬마배나무이				
	가루작지벌레				
배추	가루작지벌레	다발생기 경엽처리		수확 30일 전	
	조팝나무진딧물				
배추	무잎벌레	다발생기 경엽처리		수확 7일 전	
	배추좀나방				
복분자	꽃매미	약충 다발생기 경엽처리		수확 21일 전	
	각진장미흰각지벌레	발생 초 경엽처리			
복숭아	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리	10mL	수확 21일 전	
	복숭아순나방	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	복숭아심식나방				
사과	은무늬곰나방	발생 초 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전	
	복숭아심식나방				
	복숭아순나방	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	잎말이나방				
	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리			
수박(복수박 포함)	사과혹진딧물			3회 이내	
	아메리카잎굴파리	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	목화진딧물	다발생기 경엽처리			
오이	목화바둑명나방	다발생기 경엽처리		수확 2일 전	
	온실가루이	발생 초 7일 간격 경엽처리			
	복숭아심식나방	발생 초 10일 간격 경엽처리			
콩	콩나방	다발생기 경엽처리		수확 7일 전	
	톱다리개미허리노린재	다발생기 경엽처리			
토마토(방울토마토 포함)	온실가루이	발생 초 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전	
포도	꽃매미	다발생기 경엽처리		수확 3일 전	
				수확 14일 전	



원예용
살충제

223 | 유토피아 액상수화제