

일등탄

액상수화제



- ▶ 과수 주요병해에 강력한 방제효과
트리아졸계, 스트로빌루린계의 혼합제로서 상승효과를 나타내어 내성 병원균에도 우수한 방제효과 발휘
- ▶ 빠른 효과
약제 살포 후 수초 내에 병원균 활동을 억제하므로 병 진전이 확연하게 저지됨
- ▶ 우수한 내우성과 긴 약효지속기간!

품목명: 메트코나졸 + 피라클로스트로빈 (8+9)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 보통독성, 어독성 | 급 | 포장단위: 100㎖×100EA, 250㎖×40EA | 작용기작: 사1+다3

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
감(단감 포함)	탄저병 동근무늬낙엽병	6월상순부터 10일간격 경엽처리		수확 21일 전	
고추(단고추류 포함)	탄저병	발병 초 10일간격 경엽처리		수확 7일 전	
다래	그을음병 탄저병	발병 초 경엽처리		수확 14일 전	
대추	탄저병 녹병			수확 14일 전	
마늘	임마름병 녹병	발병 초 10일간격 경엽처리		수확 21일 전	
망고	탄저병	발병 초 경엽처리			
매실	검은별무늬병	4월 중순부터 10일간격 경엽처리		수확 14일 전	
모과	탄저병	발병 초 경엽처리			
무화과				수확 7일 전	
배	검은별무늬병	발병 초 10일간격 경엽처리	10㎖	수확 14일 전	3회 이내
복분자	탄저병	발병 초 경엽처리		수확 7일 전	
복숭아	잿빛무늬병	발병 초 7일간격 경엽처리		수확 14일 전	
블루베리	탄저병	발병 초 경엽처리		수확 3일 전	
사과	갈색무늬병	발병 초 10일간격 경엽처리			
	탄저병	6월상순부터 10일간격 경엽처리		수확 21일 전	
	점무늬낙엽병	발병 초 10일간격 경엽처리			
살구	겹무늬썩음병	6월상순부터 10일간격 경엽처리			
	탄저병	발병 초 경엽처리		수확 7일 전	
	잿빛무늬병	발병 초 10일간격 경엽처리			
석류	탄저병	발병 초 경엽처리			
	열매썩음병	착과기부터 경엽처리		수확 14일 전	
앵두	탄저병	발병 초 경엽처리			
양앵두(체리)				수확 7일 전	

원예용
살균제

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
양파	흑색썩음균핵병	월동 후 10일 간격 경엽처리	10㎖(150ℓ / 10a)	수확 14일 전	
	노균병	발병 초 7일 간격 경엽처리			
	잎마름병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
유자	탄저병	발병 초기 경엽처리	10㎖	수확 21일 전	
인삼	점무늬병	발병 초기 10일 간격 경엽처리			
	탄저병	발병 초기 10일 간격 경엽처리			수확 50일 전
자두	잿빛무늬병	발병 초기 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전	3회 이내
	탄저병	발병 초기 경엽처리			
참다래(키위)			10㎖	수확 14일 전	
콩				수확 21일 전	
파(쪽파 포함)	녹병	발병 초기 10일 간격 경엽처리			
포도	잿빛곰팡이병	발병 초기 7일 간격 경엽처리	10㎖	수확 14일 전	
	탄저병	발병 초기 10일 간격 경엽처리			

작용기작

트리아졸계
메트코나졸

강력한 예방/치료 효과
[치료 효과 > 예방 효과]

스트로빌루린계
피라클로스트로빈

뛰어난 약효 발현
넓은 항균 스펙트럼

원예용
살균제

129 | 일등탄 액상수화제

