

# 찬찬



## 입상수화제

- ▶ **원에 종합살균제**  
과수의 갈색무늬병, 탄저병 고추의 탄저병 등 여러 작물의 다양한 병해에 효과 발휘
- ▶ **치료와 예방효과를 겸비**  
트리플록시스트로빈의 치료 효과와 이프로디온의 예방 효과의 절묘한 조합
- ▶ **저항성 곰팡이에 안정적 효과**  
최근 EBI계통과 스트로빌루린계통의 저항성이 생긴 곰팡이에도 안정적인 효과 발휘

품목명 : 이프로디온 + 트리플록시스트로빈 (30+8) % | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 | 급 | 포장단위 : 200g x 40EA, 500g x 20EA | 작용기작 : 마3+다3

### 적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준		
				시기	횟수	
감귤	검은점무늬병	6월 상순부터 2주 간격 경엽처리	20g	수확 21일 전	3회 이내	
	더덩이병	춘지발생 초 15일 간격 경엽처리				
	젓빛곰팡이병	발병 초 10일 간격 경엽처리				
고추(단고추류 포함)	흰가루병			수확 2일 전		
	탄저병					
금감(금귤)	검은점무늬병	발병 초 경엽처리		수확 21일 전		
대추	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전		
딸기	탄저병(육묘상)	발병 초 7일 간격 경엽처리		육묘상		2회 이내
배	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리		4회 이내		
	젓빛곰팡이병					
	붉은별무늬병					
복숭아	검은별무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 7일 전		
	탄저병					
	젓빛무늬병					
사과	갈색무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 14일 전			
	점무늬낙엽병					
	겉무늬썩음병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리				
	수박(복수박 포함)	탄저병		발병 초 10일 간격 경엽처리		
유자	더덩이병	춘지발생시 경엽처리	수확 21일 전	3회 이내		
인삼	점무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리				
잔디	갈색잎마름병	발병 초 7일 간격 토양관주처리	20g(1ℓ/m <sup>2</sup> )	-	-	
	동전마름병	발병 초 10일 간격 경엽처리	20g	-	-	
	라이족토니아마름병	발병 초 7일 간격 토양관주처리	20g(1ℓ/m <sup>2</sup> )	-	-	
포도	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리	20g	수확 21일 전	4회 이내	
	새눈무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리				
	젓빛곰팡이병	발병 초 10일 간격 경엽처리				
갈색무늬병						